

Señalan riesgo de esclerosis con vacunas contra la hepatitis B

Un estudio francés señala un riesgo, en los niños, de desarrollar esclerosis múltiple con la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B, la Engerix B.

El estudio, dirigido por el profesor Marc Tardieu, del servicio de neuropediatría del hospital Bicêtre del Kremlin-Bicêtre, será publicado dentro de poco. El avance lo dio a conocer Le Monde esta semana.

El riesgo no se asocia a todas las vacunas contra la hepatitis B, se trata en especial de la Engerix B.

Las autoridades francesas iniciaron un estudio para profundizar los hallazgos y analizar la recomendación de la vacunación de los lactantes para prevenir la enfermedad.

El estudio del equipo de Tardieu se centra en la vacuna empleada en Francia, que son dosis de Engerix B para lactantes y niños mediante el seguro social. Precisan que no hay mayor riesgo con otra vacuna: la GenHevacB.

Las autoridades de salud trabajan desde hace algunos meses para mejorar la información al público, la prevención y el tratamiento de los afectados.

La dirección general de salud reunió el 24 de este mes a epidemiólogos para analizar el estudio. La esclerosis múltiple es también conocida como esclerosis diseminada y esclerosis en placas. Es una enfermedad cuya causa es desconocida. Se caracteriza por la aparición de placas (estructuras caracterizadas por la pérdida de mielina que envuelve el axón neuronal) en el sistema nervioso central (S.N.C.). Estas placas aparecen por brotes y pueden surgir en cualquier parte de la sustancia blanca del S.N.C.

Entre otros, la esclerosis múltiple puede causar:

Síntomas Motores

- El paciente puede quejarse de arrastrar la pierna al caminar
- Pérdida de fuerza en las extremidades
- Sensación de fatiga, pesadez o rigidez en las piernas
- Tropiezos

Trastornos Sensitivos

- Adormecimiento de las extremidades
- Alteraciones de la sensibilidad
- Menor sensibilidad térmica (hipostesia térmica)
- Menor sensibilidad dolorosa (hipostesia dolorosa)
- Inestabilidad al caminar (ataxia)
- Pérdida brusca de la agudeza visual
- Diplopía (visión doble)
- Trastorno de los esfínteres rectal y vesical
- Síntomas mentales: Alteración de la memoria, demencia, etc.

Fuente: connuestroperu.com